

## INFORMACJA DLA HODOWCÓW DROBIU

**W związku z zagrożeniem występowania grypy ptaków hodowcy drobiu powinni zachować szczególną ostrożność i stosować odpowiednie środki bioasekuracji minimalizujące ryzyko przeniesienia wirusa grypy ptaków do gospodarstwa, w szczególności:**

- **Zabezpieczyć paszę przed dostępem zwierząt dzikich;**
- **Nie karmić drobiu na zewnątrz budynków w których drób jest utrzymywany;**
- **Stosować w gospodarstwie odzież i obuwie ochronne oraz po każdym kontakcie z drobiem lub dzikimi ptakami umyć ręce wodą z mydłem;**
- **Stosować maty dezynfekcyjne w wejściach i wyjściach z budynków w których drób jest utrzymywany**

### HODOWCO!!!

Pamiętaj o zgłaszaniu niezwłocznie do odpowiednich osób i instytucji (lekarz weterynarii prywatnej praktyki, powiatowy lekarz weterynarii, wójt/burmistrz/prezydent miasta) podejrzenia wystąpienia choroby zakaźnej drobiu ( spadek nieśności ,nagłe , zwiększone, padnięcia drobiu).

#### Objawy kliniczne wysoce zjadliwej grypy ptaków ( HPAI) u drobiu

Depresja, gwałtowny spadek /utrata produkcji jaj, miękkie skorupy jaj, objawy nerwowe, zasinienie i obrzęk grzebienia i dzwonków, silne łzawienie, obrzęk zatok podoczołowych, kichanie, duszność, biegunka. Padnięcia ptaków mogą być nagłe , bez widocznych objawów .

[Szczegółowe informacje o obowiązujących nakazach i zakazach zawarte są w obowiązującym rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków .](#)

# UWAGA ! HPAI

ZASADY, KTÓRYCH NALEŻY PRZESTRZEGAĆ W CELU OCHRONY GOSPODARSTWA PRZED WIRUSEM WYSOCE ZJADLIWEJ GRYPY PTAKÓW (HPAI)

